

# EQUAL Candida Score 2018: Az ECMM által létrehozott, aktuális irányelveken alapuló pontrendszer, melynek segítségével mérhetővé válik a candidaemia klinikai ellátásának minősége


Cornely OA<sup>1,2</sup>, Köhler P<sup>1,2</sup>, Mellingshoff SC<sup>1,2</sup>, Sinkó J<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Department I for Internal Medicine, Excellence Center for Medical Mycology (ECMM), University of Cologne, Germany;

<sup>2</sup> CECAD Cluster of Excellence, University of Cologne, Germany; <sup>3</sup> Department of Hematology and HSCT, South-Pest Central Hospital, National Institute of Hematology and

Infectious Diseases, Budapest, Hungary

DOI: 10.4126/FRL01-006410985



## Háttér

Az EQUAL Candida Score a candidaemia ideális ellátásához javasolt felételeket súlyozza és összesíti. Ezzel eszközként szolgál mind az antifungális stewardship területén, mind az irányelvek követésének mérésében. Az *European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases*<sup>4,5</sup> és az *Infectious Diseases Society of America*<sup>3</sup> hatályos irányelveit áttekintve, az ellátás minőségét érintő leghatározottabb ajánlások szolgáltak az értékelési rendszer alapjául.

## Maximális pontszámok

### Centrális kanül nincs

Diagnózis

10

Terápia

7

Követés

2

Összesen

19

### Centrális kanül van

Diagnózis

10

Terápia

10

Követés

2

Összesen

22

## Irodalom

1. Mellingshoff et al. *Mycoses* 2018; 2. Koehler et al. *Mycoses* 2014; 3. Pappas et al. *Clin Infect Dis* 2016; 4. Cuenca-Estrella et al. *Clin Infect Dis* 2012; 5. Cornely et al. *Clin Microbiol Infect* 2012; 6. Munoz et al. *Diagn Microbiol Infect Dis* 2017; 7. Andes et al. *Clin Infect Dis* 2012.

## EQUAL Candida Score 2018 <sup>1,2</sup>

Diagnózis

Kezdeti hemokultúra (40mL) <sup>3,4</sup>

3

Species identifikálás <sup>3,4</sup>

3

Érzékenységi vizsgálat <sup>3,4</sup>

2

Echocardiographia <sup>3,5</sup>

1

Szemfenék vizsgálat <sup>5,6</sup>

1

Terápia

Echinokandin terápia <sup>3,5</sup>

3

Az érzékenységi vizsgálat eredményének függvényében visszaváltás flukonazolra <sup>3,5</sup>

2

Kezelés az első negatív follow-up hemokultúra után 14 napig <sup>3,5</sup>

2

Centrális kanült viselők\*: kanüeltávolítás <sup>3,5,7</sup>

3

A diagnózist követően 24 órán belül

A diagnózishoz képest > 24 < 72 órán belül

2

\* A kanülviselők plusz pontokat kapnak, ez befolyásolja az elérhető összesített értéket

Követés

Follow-up hemokultúra (legalább napi egy, amíg negatív nem lesz) <sup>3,5</sup>

2



UNIKLINIK  
KÖLN

European Confederation of Medical Mycology



Center of Excellence in Clinical and  
Laboratory Mycology and Clinical Studies